









# KLASIFIKAČNÍ MODEL RAN



TYP RÁNY	POPIS RÁNY	CÍL HOJENÍ	DOPORUČENÝ MATERIÁL	POZNÁMKA
<b>NEKROTICKÁ</b>  	<p>Černá suchá tkáň.</p> <p>Šedá, žlutá ulpívající tkáň.</p>	Odstranit neživou tkáň.	<p>NTRASITE GEL</p> <p>INTRASITE CONFORMABLE</p>	Nutné krýt okluzivním (nepropustným) krytím-filmové krytí, hydrokoloidy, pěny. Nutná kontrola po 48 hodinách.
<b>INFIKOVANÁ</b>  	<p>Přítomné znaky infekce. Zápach, zvýšená sekrece, povlaky, atd.</p> <p>Podminované okraje, choboty, píštěle.</p>	<p>Snížit bakteriální zátěž, absorbce exsudátu.</p> <p>Zabezpečit hojení od spodiny rány absorbce exsudátu.</p>	<p>ACTICOAT, ACTICOAT Flex, BACTIGRAS, ALGISITE Ag, ALLEVYN Ag, DURAFIBER Ag, CARBONET IODOSORB</p>	<p>Kontrola, případná výměna po 2-3 dnech.</p> <p>Výměna při protečení sekundárního krytí.</p>
<b>GRANULUJÍCÍ</b>  	<p>Červená, prokrvená tkáň. (Vzhled malin)</p>	Podpořit granulaci a ochrana nově vzniklé tkáně.	<p>ALLEVYN LIFE, ALLEVYN Gentle, REPLICARE</p>	Kontrola, případná výměna po 2-3 dnech.
<b>EPITELIZUJÍCÍ</b>  	<p>Narůžovělá tkáň.</p>	Podpořit a ochránit epitalizaci.	<p>ALLEVYN Gentle Border Lite, JELONET, CUTICERIN</p> <p>OPSITE - filmové krytí, SECURA sprej</p>	Kontrola, případná výměna po 3-5 dnech.
<p><b>PREVENCE vzniku dekubitů SACRUM, PATA</b></p> <p><b>PREVENCE infekce v pooperační ráně OPERAČNÍ RÁNA</b></p>	<p>Prevence a ochrana vzniku dekubitů či jiných poškození.</p> <p>Prevence vzniku infekce v operační ráně.</p>		<p>OPSITE FLEXIFIX Gentle, OPSITE FLEXIFIX, FLEXIGRID</p> <p>SECURA sprej, ALLEVYN LIFE Sacrum, ALLEVYN LIFE Heel</p>	<p>V případě poškození nutné postupovat dle aktuálního typu rány.</p> <p>Není nutné sekundárně krýt.</p> <p>Nutné sekundární krytí.</p>